


# ВНИМАНИЕ! ОТИТ!

**СРЕДНИЙ ОТИТ** – это воспаление среднего уха (полость между барабанной перепонкой и внутренним ухом).

## КРИСТИНА, мама Юли (1 год 8 мес.)

«Утром в воскресенье мы планировали провести день в парке, но внезапно Юляша стала плакать, капризничать, потягивать ушко. У нее поднялась температура. Дочка плакала и жаловалась: «Ушко больно!» Мы пролечились, но через полгода все повторилось снова, и было гнойное отделяемое из ушка... Всего у дочки было четыре случая обострения, а сейчас у нее ухудшился слух».



## НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ИНФЕКЦИИ СРЕДНЕГО УХА?<sup>1,2</sup>

- ➔ Инфекции среднего уха у детей младшего возраста встречаются чрезвычайно часто. На первом году жизни до 80% детей хотя бы один раз болеют средним отитом, а у 40% отмечается два-три рецидива заболевания.<sup>1</sup>
- ➔ Тяжелое, часто повторяющееся гнойное воспаление среднего уха может привести к перфорации барабанной перепонки, что вызывает снижение слуха вплоть до полной его потери!
- ➔ 55% острых средних отитов у детей обусловлены пневмококком.

Распространение пневмококка от человека к человеку происходит преимущественно воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также при контакте с предметами (контактный путь), которые соприкасались со слюной (ложки, чашки, игрушки и т.п.). Опасность заболеть существует круглогодично!<sup>2</sup>

