

## ПРЕДОТВРАТИТЕ ПНЕВМОНИЮ У ВАШЕГО МАЛЫША – СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ!\*



### СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА МАЛЫША:

#### Если Вашему малышу 2 месяца:<sup>3</sup>

двукратная вакцинация: в 2 месяца и в 4,5 месяца. Третью дозу (т.е. ревакцинацию) рекомендуется вводить на втором году жизни в 15 месяцев.

Если по какой-то причине Вы пропустили плановые прививки, рекомендуются следующие схемы:

#### Если Вашему малышу от 3-х до 11 месяцев:

двукратная вакцинация с интервалом не менее месяца между введениями. Третья доза (т.е. ревакцинация) рекомендуется на втором году жизни, не ранее чем через 2 месяца после введения второй дозы.

#### Если Вашему малышу от 12 до 23 месяцев:

двукратная вакцинация с интервалом между введениями не менее 2-х месяцев.

#### Если Вашему малышу от 2-х до 5 лет (включительно):

проконсультируйтесь с врачом.

\*снижение рентгеноподтвержденной пневмонии на 31%<sup>4</sup>-44,9%<sup>5</sup> в зависимости от возраста

#### Литература:

1. Pneumococcal vaccines WHO position paper—2012. Wkly Epidemiol Rec. 2012 Apr 6;87(14):129-44.
2. МР 3.3.1.0027-11 «Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой *Streptococcus pneumoniae*».
3. Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. № 125н.
4. Daniel M. Weinberger, Noga Givon-Lavi, Yonat Shemer-Avni, Jacob Bar-Ziv, Wladimir J. Alonso, David Greenberg, and Ron Dagan. Influence of Pneumococcal Vaccines and Respiratory Syncytial Virus on Alveolar Pneumonia, Israel. Emerging Infectious Diseases www.cdc.gov/eid Vol. 19, No. 7, July 2013
5. Hortal, M., et al., Hospitalized children with pneumonia in Uruguay: Pre and post introduction of 7 and 13-valent pneumococcal conjugated vaccines into the National Immunization Program. Vaccine, 2012. 30(33): p. 4934-4938.